

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

D L P 24 - 4 - 69 919219

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

5, Place Paul Jamot - 51-REIMS - Tél. 47.22.87

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 4 AU BULLETIN N° 103 d'AVRIL 1969

23 AVRIL 1969 / n° 12

ARBORICULTURE FRUITIERE

AVERTISSEMENT

Tavelure du pommier et du poirier

Les vergers traités avant la période pluvieuse du 21 avril étaient protégés des premières contaminations qui se sont produites à ce moment.

Compte tenu du lessivage provoqué par ces dernières pluies et de la pousse des arbres il y a lieu de renouveler le traitement.

Nous attirons l'attention des arboriculteurs sur le danger que présente la période actuelle pour les pommiers et poiriers. Nous confirmerons dans un prochain avis les dates d'apparition des premières taches foliaires de tavelure qui constitueront alors des sources d'infestation s'ajoutant aux risques graves de contamination par ascospores durant le mois de mai.

INFORMATIONS

Oïdium du pommier

Profiter du traitement anti-tavelure pour assurer une protection contre l'oïdium.

Monilia du cerisier - prunier

Appliquer sur ces arbres une nouvelle protection.

Dessèchement des jeunes pousses de Framboisier (Didymella applanata)

Appliquer un traitement à l'aide de Thirame (200 g.) ou de Mancozèbe (160 g.) de matière active par Hl.

Anthracnose du groseillier et Cassissier

Envisager l'emploi d'un produit cuprique ou organo-cuprique avant la fleur ; ou d'un organique de synthèse (mancozèbe 160 g. M.A./Hl) avant et après le fleur.

/...

P 275

GRANDE CULTURE

INFORMATIONS

Meligèthes sur colza d'hiver

Les colzas évoluent lentement vers la floraison alors que les méligèthes se montrent peu actifs.

Surveiller les cultures si un réchauffement prochain intervient et traiter éventuellement avant que des dégâts sérieux aient été causés aux boutons.

Dès que les premières fleurs apparaissent le traitement ne se justifie plus.

Charançon des siliques

Aucune intervention n'est à envisager prochainement.

Sitone sur pois et luzerne

Quelques attaques sont observées sur semis de pois et jeunes luzernes.

Si des dommages sérieux sont occasionnés aux jeunes feuilles, effectuer un traitement par poudrage ou par pulvérisation en amenant un minimum d'eau.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytosanitaire " CHAMPAGNE "